

Ops. Dr. Çağrı Sade

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI



Meme İmplantı

Breast Augmentation

Her kadın hayatının bir dönemde, özgüvenini tazeleme ya da yenilenme ihtiyacı duyabilir.

Every woman may need to reboot her self confidence at certain times in her life.



Meme implantı operasyonu, bu konuda kişinin kendilerine verebileceği en güzel ve en kalıcı armağandır.

Breast augmentation surgery is the most valuable and enduring gift a woman may give to herself.



Meme İmplanti *Breast Augmentation*

İdeal sayılan göğüs büyüğünü, varlığını hissettirmeli ama vücuttan taşmamalıdır.

The ideal breast size should be so that the breasts are noticeable, but don't greatly protrude from the body.

Göğüsler ergenlik döneminde yeterli büyüğüne ulaşamamış ya da, hamilelik sonrası dolgunluğunu yitirmiş olabilirler. Bazen de, aşırı kilo kaybı nedeniyle sarkma olmaksızın volüm kaybı olabilir. Meme implantı ameliyatı, bu ve benzer sorunlar için en uygun çözümüdür.

Breasts may not have reached a sufficient size during adolescent development, or may have lost their fullness after pregnancy. Sometimes, their volume can be lost without sagging due to excessive weight loss. Breast augmentation surgery is the most appropriate solution for these kind of problems.

Op. Dr. Çağrı Sade



Meme İmplanti Breast Augmentation



Operasyonun amacı, kişinin vücut yapısına en çok yakışan formu elde etmek ve değişen koşullara uyum sağlayan (hamilelik, kilo alıp verme, yaş alma gibi durumlarda) sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaktır.

Meme büyütme ameliyatı, meme dokusu arkasına silikon implantın yerleştirilmesi işlemidir ve 3 ayrı yerden yapılabilir;

Koltuk altı çizgisi,

Meme ucunun alt kısmında kahverengi ve beyazın birleşim noktası ya da, memenin alt kıvrımı.

The purposes of the operation are multifold; the client's body structure will get to be in its most appealing form, it will help the patient to adapt to changing conditions (like pregnancy, putting on weight, getting old) and also the client will be able to lead a healthy life.

The overall surgery is a simple process where an incision is made and the silicon implant is placed behind the breast tissue;

Firstly the incision is made and can be done from three separate locations;

Either at the axillary location (under the armpits), At the bottom of the nipple (from the breast skin's brown and white combination) or,

From the lower fold of the breast.

Op.Dr.Cağrı Sade




İmplant 3 ayrı noktaya konulabilir;
Meme dokusu altı,
Dokunun altındaki kasın üst zarı ya da,
Dokunun altındaki kasın arkası.

Silikon tipleri çeşitlilidir;
Şekline göre, damla ve yuvarlak.
Yüzey yapısına göre, pürüzlü ve düz yüzelyi.
Yüksekliğine göre yayvan, orta çıkışlı, ileri
çıkıntılı ve çok ileri çıkışlı.
İçeriğine göre, cohesive jel ve serum fizyolojikli.

After the incision is made, the silicon implants are placed. These implants can be placed in three different locations;
Under the mammary tissue,
Behind the upper membrane of the muscle's underlying tissue or,
At the back of the muscle tissue beneath the mammary tissue.

Silicon types are varied according to these specifications;
The form may be called drop or round.
The surface structure may be coarse or smooth.
The silicon protrusion may be either evenly splayed, or with the middle protruding forward creating a peak that can be either small or large.

Meme İmplanti Breast Augmentation



Kesi yeri, protezin konulacağı yer ve kullanılacak olan silikon tipi, kişiden kişiye değişir.

Yapılan muayenenin ardından, en doğru yöntem ve silikon türü bekłentileriniz göz önüne alınarak önerilir.

Ameliyat gününün menstrüasyon (regl) dönemine denk gelmemesine dikkat edilmeli ve 2 haftalık süre içinde aspirin ve yeşil çay gibi kan sulandırıcıların tüketilmemiş olması gereklidir.

Ameliyat genel anestezi altında (tamamen uyutularak) yapılır ve yaklaşık 1,5 - 2 saat kadar sürer.

Incision location, silicone type and placement location vary from person to person.

The most accurate method of operation needed and the type of silicon to be used will be advised to you according to your anatomical features (and taking into account your expectations) by your doctor.

The surgery is not recommended for a patient who is in their menses (menstrual) period.

For 2 weeks before the surgery, the patient should cease the consumption of any blood thinners such as aspirin and green tea.

Op.Dr.Cağrı Sade



Operasyon sonrası en ağrılı süreç, ilk 12 saatlik olan kısmıdır. Bu süre içerisinde kullanılan serumda özel bir ilaç karışımı vardır. Bu karışım sayesinde ağrı hissedilmez.

Hastanede 1 gece kalınması yeterlidir.

İlk 1 ay, abartılı kol hareketleri yapmak (örneğin yükseğe uzanmak) ve yüz üstü yatmak tavsiye edilmez.

The surgery is done under general anesthesia and it takes about 1.5 - 2 hours.

*The most painful part of the operating procedure is the first 12 hours immediately following the operation. However the patient doesn't experience this pain as a serum is administered with a special drug mixture which numbs the pain.
A patient needs to stay in the hospital for only one night after the operation.*

During the first 1 month after the operation, it's recommended that the patient not make any exaggerated arm movements (for example, reaching high), or sleep on their stomach.



*Bir ömür boyu
sağlık ve güzellikle...*

A lifetime of health and beauty...

S.S.S.

Sık sorulan sorular
ve yanıtları;

F.A.Q.

*Frequently asked questions
and answers;*

Bir süre sonra silikonun değiştirilmesi gereklidir mi?
Hayır, gerek yoktur. Yeni silikonlar ömür boyu kullanılabılır.

Silikon kanser yapar mı?
Hayır, kanser yapmaz. Bilimsel çalışmalar, silikonun kanserle hiçbir alakasının olmadığını göstermiştir.

İmplant patlalar mı, ya da patlarsa içindeki silikon akar mı?
Yeni tip silikon implantlarının içerisinde sıvı kullanılmamaktadır. İmplant, jöle kıvamında akmayan (cohesive) jel ile doludur, bu nedenle de implantın patlaması mümkün değildir.

Dikiş alınacak mı?
Hayır, alınması gereken herhangi dikiş yoktur.

Silikon implant çocuk emzirmeye engel midir?
Hayır, emzirmeye engel teşkil etmez.

Hamilelik esnasında silikon çıkarılmalı mıdır?
Hayır, çıkarılmasına gerek yoktur.

Does the silicon need to be replaced after a while?
No, it is not necessary. New silicon implants last a lifetime.

Do silicon implants cause cancer?
No, they don't cause cancer. Scientific studies have shown that silicon implants have nothing to do with cancer.

Can the silicon implants explode or leak into the surrounding tissue?
Liquid is not used in the new types of silicone implants. With the new implants, the entire implant material consists of a single cohesive gel so it's impossible for it to burst and spill its contents.

Are any stitches necessary?
No, there aren't any stitches used.

Do silicone breast implants interfere with a baby's breastfeeding?
No, it does not interfere with breastfeeding.

Should silicon be removed during pregnancy?
No, there is no need for it to be removed.

Op.Dr.CağrıSade

ESTETİK, PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI

Abdi İpekçi Cad. No: 61/6 Reasürans Han 2
Teşvikiye, Nişantaşı 34367 İstanbul, TÜRKİYE
T: 0212 248 0808 **F:** 0212 248 8280 **M:** 0532 452 5724



[facebook.com/Op.Dr.CagriSade](https://www.facebook.com/Op.Dr.CagriSade)



twitter.com/Op.Dr.CagriSade



youtube.com/cagrisade



instagram.com/cagrisade

dr@cagrisade.com.tr